



PRODUCTION D'UN ALIMENT APPROPRIE: suffisant, sain, durable

Collecte des données sur le groupe des nouveau-nés auquel il n'a pas été administré le noyau protéique dans la purée de substitution des tétées maternelles au **TEMPS INITIAL 0**, c'est-à-dire au moment initial de l'essai.

Nom du nouveau-né SANS noyau protéique	Date de début de l'essai (Temps 0)	Poids au Temps 0 (C'est le poids du nouveau-né au début de l'essai, exprimé en kg)	Types d'aliments donnés au nouveau-né, en plus du lait maternel (par exemple, la farine de maïs, ou farine de manioc ou les deux) au temps 0	L'état de santé de nouveau-né au début de l'essai (Déclarez si il souffre d'une maladie, si il présente la dysenterie ou d'autres troubles)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				



PRODUCTION D'UN ALIMENT APPROPRIE: suffisant, sain, durable

Collecte des données sur le groupe des nouveau-nés auquel il n'a pas été administré le noyau protéique dans la purée de substitution des tétées maternelles au **TEMPS 1**, c'est-à-dire après 1 mois du temps initial de l'essai.

Nom du nouveau-né SANS noyau protéique	Date au Temps 1	Poids au Temps 1 (C'est le poids du nouveau-né à 1 mois du début de l'essai, exprimé en kg)	Types d'aliments donnés au nouveau-né, en plus du lait maternel (par exemple, la farine de maïs, ou farine de manioc ou les deux) au temps 1	L'état de santé de nouveau-né au début de l'essai (Déclarez si il souffre d'une maladie, si il présente la dysenterie ou d'autres troubles)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				



PRODUCTION D'UN ALIMENT APPROPRIE: suffisant, sain, durable

Collecte des données sur le groupe des nouveau-nés auquel il n'a pas été administré le noyau protéique dans la purée de substitution des tétées maternelles au **TEMPS 2**, c'est-à-dire après 1 mois du temps initial de l'essai.

Nom du nouveau-né SANS noyau protéique	Date au Temps 2	Poids au Temps 2 (C'est le poids du nouveau-né à 2 mois du début de l'essai, exprimé en kg)	Types d'aliments donnés au nouveau-né, en plus du lait maternel (par exemple, la farine de maïs, ou farine de manioc ou les deux) au temps 2	L'état de santé de nouveau-né au début de l'essai (Déclarez si il souffre d'une maladie, si il présente la dysenterie ou d'autres troubles)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



PRODUCTION D'UN ALIMENT APPROPRIE: suffisant, sain, durable

Collecte des données sur le groupe des nouveau-nés auquel il n'a pas été administré le noyau protéique dans la purée de substitution des tétées maternelles au **TEMPS 3**, c'est-à-dire après 1 mois du temps initial de l'essai.

Nom du nouveau-né <u>SANS noyau protéique</u>	Date au Temps 3	Poids au Temps 3 (C'est le poids du nouveau-né à 3 mois du début de l'essai, exprimé en kg)	Types d'aliments donnés au nouveau-né, en plus du lait maternel (par exemple, la farine de maïs, ou farine de manioc ou les deux) au temps 3	L'état de santé de nouveau-né au début de l'essai (Déclarez si il souffre d'une maladie, si il présente la dysenterie ou d'autres troubles)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



PRODUCTION D'UN ALIMENT APPROPRIE: suffisant, sain, durable